Click to prove you're human

إرشادات علاج الإسهال المعديني

[illegible] الإسهال [illegible] شرب الكثير من السوائل، قد تساعد محاليل معالجة الجفاف عن طريق الفم، مثل [illegible] بسبب تدمره للبكتيريا النافعة بجانب البكتيريا الضارة. ويمكن أن تسبب مضادات الحموضة التي تحتوي على نسبة عالية من الماغنيسيوم وكذلك العقاقير المستخدمة في علاج الأورام الخبيثة، إسهالًا أيضًا. كما قد يسبب الاستخدام المفرط للمليّنات إسهالًا. إذا تناول الأشخاص المصابين بحساسية اللاكتوز منتجات ألبان غنية باللاكتوز، قد يصابون بالإسهال. هل يمكن أن تصيبك متلازمة القولون العصبي بالإسهال؟ تعتبر متلازمة القولون العصبي سيئًا شائعًا "الإسهال الوظيفي" وهو نوع من الإسهال المزمن حيث لا تظهر أي مشكلة بأي عضو بالجهاز الهضمي إلا أن الجهاز الهضمي لا يزال لا يعمل بشكل صحيح. وتتسبب متلازمة القولون العصبي بصفة أساسية في تشنجات وألم في البطن وحركات معوية غير سليمة ومن [illegible] ومن [illegible] 3 أيام. تعويض السوائل: في الحالات التي يتسبب فيها الإسهال جفافًا حادًا لدى المرضى ولا يجدي معه شرب المزيد من السوائل، قد يعطى الأطباء سوائل من خلال قطرات الخفن الوريدي. كما قد يقترح الأطباء استخدام محلول/أملاح الإماهة الفموي. وتحتوي محاليل/أملاح الإماهة الفموي، داء الأمعاء الالتهابي، الداء البطني. إلخ. عن طريق التشخيص ومن ثم علاج المرض المتسبب. [illegible] 90% من حالات الإسهال البسيطة. علاج الأمراض المميتة: يُعالج الإسهال بسبب متلازمة القولون العصبي، داء الأمعاء الالتهابي، الداء البطني. إلخ. عن طريق التشخيص ومن ثم علاج المرض المتسبب. [illegible] يعتبر الإسهال اضطراب خصمي مزعج يسبب الألم وعدم الراحة، وعادة ما يصيب الشخص بمعدل مرة أو مرتين خلال السنة الواحدة. ويمكن في الحالات البسيطة علاج الإسهال في المنزل باستخدام بعض الطرق البسيطة، التي تتضمن الإكثار من السوائل وتناول البروبيوتيك وغيرها. تعرف معنا في هذا المقال على طرق علاج الإسهال في المنزل للكبار والأطفال، محتويات المقال تعرف الإسهال (الإنجليزية [illegible] الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل البطاطس، والبطاطا الحلوة، والموز، وعصائر الفاكهة. الأطعمة المالحة التي تحتوي على الكهارل، مثل بعض أنواع الشوربات. والمهم وضع الرائحة [illegible] 2-3 مرات كل يوم. [illegible] الإسهال [illegible] الإسهال [illegible] الإسهال