

Click to prove
you're human



Quantos dias após cirurgia de vesícula pode ter relação

Gostaria de saber quanto tempo após uma cirurgia de vesícula pode ter relação sexual? Olá! Não existe uma restrição à atividade sexual. Deve ser considerado em todas as atividades no pós-operatório o tipo de esforço que será feito: leve, moderno ou grande. A atividade sexual se relaciona a isso. Espero ter respondido sua dúvida! Olá! Em geral varia de pessoa para pessoa. Oriento meus pacientes a aguardarem pelo menos 14 dias para retomar as atividades físicas leves. abs lI para o conteúdo Publicado em 31 de mar. de 2025 Atualizado em 31 de mar. de 2025 A cirurgia de vesícula biliar, também conhecida como colecistectomia, é um procedimento comum realizado para remover a vesícula biliar, geralmente devido a problemas como pedras na vesícula, inflamação ou dor abdominal. Após a cirurgia, muitos pacientes se questionam sobre o tempo necessário para retomar a vida sexual e quando é seguro ter relações íntimas. Este artigo abordará em profundidade essa temática, fornecendo informações valiosas sobre o período de recuperação pós-cirúrgica e as orientações adequadas para retomar a vida sexual.Entendendo a Cirurgia de Vesícula BiliarO que é a vesícula biliar?A vesícula biliar é um pequeno órgão localizado abaixo do fígado, responsável por armazenar a bile, que é um líquido produzido pelo fígado e necessário para a digestão das gorduras. Quando há a formação de cálculos ou inflamações, a remoção da vesícula torna-se necessária.Como é realizada a cirurgia?A colecistectomia pode ser realizada de duas maneiras: via laparoscópica e aberta. A laparoscópica é a técnica mais comum, onde pequenas incisões são feitas na pele, permitindo a inserção de uma câmera e instrumentos cirúrgicos. A cirurgia aberta, por sua vez, envolve uma incisão maior e é realizada em casos mais complicados. Ambas as técnicas exigem tempo de recuperação, mas a laparoscópica tende a promover uma recuperação mais rápida.O Processo de RecuperaçãoPeríodo pós-operatórioApós a cirurgia, é normal que os pacientes sintam um certo desconforto, dores e inchaço na região abdominal. O tempo de recuperação pode variar de pessoa para pessoa, dependendo de fatores como idade, estado de saúde geral e tipo de cirurgia realizada. Em média, o tempo de recuperação total pode levar de duas a seis semanas.Sinais de recuperaçãoOs sinais de que a recuperação está indo bem incluem a diminuição da dor, a redução do inchaço e a melhora geral do bem-estar. É importante seguir as instruções do médico quanto ao uso de medicações para dor e cuidados com as incisões.Retomando a Vida SexualQuando é seguro ter relações sexuais?O retorno à atividade sexual é uma preocupação legítima para muitos pacientes. Em geral, a maioria dos médicos recomenda a espera de pelo menos duas semanas após a cirurgia para retomar as relações sexuais. Este período é importante para permitir que o corpo restabeleça suas funções normais e minimize qualquer risco de complicações.Fatores a considerarVários fatores devem ser considerados ao decidir quando retomar a atividade sexual.Condição física: Ouça o seu corpo. Se você ainda estiver sentindo dor ou desconforto, ou se notar que sua energia não está completamente recuperada, é melhor esperar mais um pouco.Tipo de cirurgia: Pacientes que se submeteram à colecistectomia laparoscópica geralmente se recuperam mais rapidamente do que aqueles que passaram pela cirurgia aberta, podendo retomar as atividades sexuais em menos tempo.Condições pré-existentes: Se você tiver outras condições médicas ou complicações, consulte seu médico para orientações personalizadas.Dicas para um retorno seguroComunicação com o parceiro: Conversar abertamente sobre a recuperação e expressar quaisquer preocupações é fundamental para a intimidade e compreensão mútua.Seguir as recomendações médicas: Certifique-se de seguir todas as orientações do seu médico e comparecer às consultas de acompanhamento.Experimente posições confortáveis: Escolher posições que não exerçam pressão sobre a área abdominal pode ajudar a tornar a experiência mais confortável.ConclusãoA cirurgia de vesícula biliar pode ser um momento estressante e desafiador, mas a recuperação é uma etapa essencial para voltar à vida normal, incluindo a vida sexual. Em média, duas semanas de recuperação são recomendadas antes de retomar as relações, mas é crucial ouvir o seu corpo e consultar o médico para obter orientações personalizadas. Com paciência e cuidados adequados, é plenamente possível retomar uma vida sexual saudável e satisfatória após a cirurgia.FAQ1. É normal sentir dor após a cirurgia de vesícula?Sim, é normal sentir algum grau de dor e desconforto após a cirurgia. É importante seguir as orientações do médico quanto ao controle da dor.2. Posso praticar exercícios após a cirurgia?A prática de atividades físicas deve ser reintroduzida gradualmente. Normalmente, exercícios leves podem ser retomados após algumas semanas, mas atividades mais intensas devem esperar mais.3. Quais são os sinais de complicação pós-cirúrgica?Fique atento a sinais como febre alta, inchaço excessivo, drenagem de líquido das incisões ou dor intensa. Se notar qualquer um desses sintomas, consulte seu médico imediatamente.4. A remoção da vesícula biliar afeta minha dieta?Após a remoção da vesícula, algumas pessoas podem ter dificuldade em digerir gorduras. Uma dieta equilibrada e, possivelmente, a redução da ingestão de gorduras podem ser necessárias.ReferênciasSociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. (2023). Diretrizes para Cirurgia de Vesícula Biliar.American College of Gastroenterology. (2022). FAQ sobre Colecistectomia.Ministério da Saúde do Brasil. (2023). Informações sobre Saúde e Cirurgia. A cirurgia da vesícula biliar também é popularmente conhecida como colecistectomia e, nesta cirurgia, a bexiga do paciente é tratada. É realizada por laparoscopia, pois é a melhor forma de realizar esta cirurgia. Esta cirurgia é muito eficaz e é considerada uma das melhores formas de tratar problemas da vesícula biliar. Atualmente é realizado por médicos especialistas de todos os principais países.Geralmente, após a cirurgia, os médicos aconselham seus pacientes a não sair da cama porque podem não ter energia para andar. Além disso, pacientes que recentemente tiveram que se submeter a um certo tipo de cirurgia se sentirão fracos, talvez por causa de seus sedativos durante a cirurgia.A cirurgia da vesícula biliar é uma cirurgia que é realizada na parte inferior do corpo ou na área da pelve. O processo é feito fazendo pequenas incisões com o auxílio de uma câmera. É feito para diagnosticar pessoas que têm uma ampla gama de condições desenvolvidas em seu abdômen ou pelve. No entanto, a cirurgia também pode ser realizada para remover órgãos danificados ou doentes ou remover tecidos para outros processos de teste. Portanto, levará até um dia para o paciente se recuperar da cirurgia.O paciente é aconselhado a descansar estritamente por um dia ou dois antes de fazer suas tarefas. Se o paciente estiver tomando remédios narcóticos, ele deve evitar dirigir, correr e outros tipos de atividades semelhantes. O pós-operatório deixará o paciente com vários sintomas, que levarão mais algumas semanas para cicatrizar. Por exemplo, pode ocorrer inchaço no estômago, o que levará cerca de quatro semanas para normalizar. Fixe isso agora para lembrar mais tarde Fixar isto EventosInformações sobre os eventosDuração da Cirurgia da Vesícula BiliarUma a duas horasTempo após a cirurgia da vesícula biliar para fazer sexoDuas semanasA cirurgia da vesícula biliar não é um processo cirúrgico muito longo e é concluída em uma ou duas horas. No entanto, é estritamente proibido ter relações sexuais com seu parceiro por um período mínimo de duas semanas após a cirurgia.Leia também: Quanto tempo depois do álcool posso tomar Tylenol (e por quê)?Pode haver vários tipos de riscos que podem estar associados aos medicamentos que são administrados a você após a cirurgia. Então, você precisa ter bastante cuidado antes de fazer alguma atividade como dirigir um carro ou fazer algum outro tipo de trabalho. Isso ocorre porque você precisa descansar pelas próximas vinte e quatro horas, e então você pode fazer todas as suas tarefas. No entanto, ajudaria se você perguntasse ao seu médico se pode participar dessas atividades ou não, porque não poderá fazer essas atividades devido a alguns medicamentos. Portanto, é melhor seguir o conselho de um médico.Suponha que você esteja tomando remédios narcóticos; então, você não deve se entregar a nenhuma atividade. Você pode dar um passeio no parque depois de um ou dois dias após a cirurgia. Seu corpo levará algum tempo para se curar, digamos, até algumas semanas antes que seu corpo esteja totalmente estável. Você provavelmente terá dor no estômago por alguns dias, ou pode ser semanas também. Outros sintomas como você pode ter febre baixa por um tempo com cansaço. Não se preocupe ou entre em pânico porque estes são sintomas comuns após a cirurgia, e você deve se sentir bem dentro de uma ou duas semanas.Demora tanto tempo após a cirurgia da vesícula biliar para fazer sexo porque o corpo precisa de tempo suficiente para descansar e se recuperar. Além disso, após a cirurgia, os médicos não recomendam que você durma de bruços porque pode machucar a coluna e pressionar a área do quadril. Portanto, você precisa ter cuidado com seus hábitos de sono após a cirurgia e tentar dormir de costas ou de lado.Leia também: Quanto tempo leva um EEG (e por quê)?No geral, pode-se concluir que você deve ter cuidado e cuidar de si mesmo após a cirurgia ter sido realizada com sucesso. Você só pode malhar depois que seu médico recomendar que você faça isso, ou então você terá que ficar em repouso por um tempo. Se você acha que existem sintomas específicos ou dores que o incomodam, converse imediatamente com o médico e certifique-se de que as coisas estão bem.Em média, fazer sexo é proibido por duas semanas após a cirurgia. Suponha que haja algumas complicações; você deve certificar-se de que o médico sabe sobre isso. O descanso adequado é essencial para que o corpo se recupere. A cirurgia de vesícula é principalmente indicada em caso de pedra nas vesículas, e tem como objetivo principal a retirada da vesícula, sendo necessário, para isso, a anestesia geral. Após a cirurgia de retirada da vesícula, é muito importante fazer uma alimentação pobre em gorduras, evitando alimentos como carne vermelha, bacon, linguiça e frituras em geral, para evitar... A cirurgia de mudança de sexo, conhecida como cirurgia de redesignação sexual, é feita em homens e mulheres que desejam trocar os órgãos genitais. Entenda melhor o que é a cirurgia de redesignação sexual, como é feita e onde fazer. Alguns remédios, como os antiagregantes plaquetários, anticoagulantes ou anti-inflamatórios não esteroides devem ser suspensos antes de uma cirurgia, para evitar complicações graves. Veja uma lista mais completa de todos os principais remédios que devem ser interrompidos antes da cirurgia. Após uma cirurgia é comum existir dor ou incômodo no local, por isso, o médico normalmente recomenda o uso de medicamentos analgésicos assim como alguns cuidados importantes. Confira tudo o que pode fazer para aliviar a dor e recuperar mais rápido. Para evitar a trombose depois de uma cirurgia é recomendado começar a fazer pequenas caminhadas logo após a liberação do médico e usar meias elásticas. Confira outras dicas simples para fazer após uma cirurgia e evitar uma trombose. O tratamento do HPV pode ser feito com o uso de remédios na forma de pomadas ou soluções tópicas, ou cirurgias de cauterização, crioterapia ou laser, para eliminar verrugas ou lesões pré-cancerosas. Veja os principais tratamentos para HPV, com uso de remédios, cirurgias e mais. Após a cirurgia alguns cuidados são importantes para reduzir o tempo de internação, facilitar a recuperação e evitar o risco de complicações. Veja os 6 cuidados mais importantes e quando é recomendado voltar ao médico. Benefícios da Bota de Gelo para FisioterapiaExercícios Eficazes para Melhorar a Visão EmbarcadaRestauração Eficiente em EndodontiaComo Eliminar as Moscas Volantes de Forma EficazInfecção Urinária em Homens: Causas e Tratamentos EficazesExplorando o Mundo Subaquático: Fotos de Mergulho ImpressionantesComo Tratar Feridas na Pe de Forma EficazO Que é Frenotomia e Suas IndicaçõesCorrimento Branco no Pênis: Causas e TratamentosEntendendo o Pequeno Abaulamento Discal: Causas e TratamentosComo Desobstruir as Trompas de Forma EficazO Melhor Comprimido para Hemorróida: Descubra a Solução EficazCausas e Tratamentos do Edema Subcutâneo no TornozeloComo Tratar o Excesso de Pele na UnhaMenopausa Pós-Histerectomia Total: O Que Você Precisa SaberRosto Vermelho Após Quimioterapia: Causas e CuidadosTropical: Eficácia e Cuidados no Uso para Dor de CabeçaSoluções Eficazes para Eliminar Mau Cheiro nas Partes ÍntimasSintomas do PSA Alterado: O Que Você Precisa SaberCuidados e Tratamentos para Diarreia em Idosos Neste artigo do umCOMO, responderemos à dúvida: "Quanto tempo depois de uma cirurgia posso ter relação?", de acordo com cada cirurgia. Ter uma boa recuperação pós-cirúrgica é uma das partes mais fundamentais para garantir que a operação não seja comprometida e acabar gerando complicações. Uma das recomendações comuns a quase todos os tipos de cirurgia é evitar fazer esforço físico, o que acaba por incluir as relações sexuais. Entretanto, cada cirurgia tem as suas particularidades o seu tempo de repouso necessário, sendo difícil estabelecer um prazo único para todas as operações. Também lhe pode interessar: Como desinchar após cirurgia Índice É importante ter em mente que cirurgias feitas na perna podem ter diversos graus de intensidade dependendo de como e aonde exatamente a operação será feita, além do grau de comprometimento do caso. Cirurgias que envolvem o osso, por exemplo, possuem a recuperação mais delicada.O tempo ideal para retomar as atividades sexuais varia - e o ideal é tirar a dúvida diretamente com o médico responsável pelo seu caso. Se a fisioterapia for necessária, por exemplo, o tempo para voltar a ter relações deve ser prolongado.Geralmente, o tempo necessário para voltar a ter relações é o mesmo que para retomar atividades cotidianas como, por exemplo, voltar a dirigir. O tempo médio é de 6 a 8 semanas, desde que seja tomado o cuidado de realizar posições que não necessitem de muito esforço por parte do paciente. As mesmas considerações em casos de cirurgia na perna devem ser feitas para cirurgias no joelho. Precisamente, essa é uma informação que apenas o médico ortopedista pode fazer, avaliando o seu caso específico. O tempo médio de recuperação de uma cirurgia no joelho é de 4 a 6 semanas.Contudo, é preciso ter em mente que cirurgias no joelho costumam ser muito delicadas - principalmente para quem já pratica esportes ou possui uma rotina de atividades físicas. Nesses casos, a fisioterapia é fundamental para garantir uma recuperação efetiva. O tempo médio de recuperação de uma cirurgia no braço é de 1 mês. Esse tempo é necessário para que os pontos da cicatriz não se abram, e varia de acordo com a gravidade da cirurgia e também com o local que ela foi realizada.Mas é dentro do prazo de um mês que o paciente já pode retomar atividades como trabalhar, dirigir, praticar atividades físicas leves como caminhar e ter relações sexuais. Dentro de três meses, já é permitida a prática de exercícios mais pesados, como a prática de esportes e musculação. O ideal é aguardar no mínimo 1 mês para fazer sexo após a cirurgia. Dentro desse prazo, é permitido ter relações sexuais desde que feitas com muito cuidado com o paciente. Após 2 meses, as relações sexuais já podem ser feitas normalmente sem restrições, pois o paciente já estará recuperado. A cirurgia de vesícula costuma ter a recuperação mais rápida do que as cirurgias citadas acima. Segundo médicos cirurgiões, o tempo médio ideal para retomar atividades físicas leves é após 15 dias, ou seja, já é possível ter relações sexuais, mas desde que sejam feitas com cuidado para não exigir demais do paciente.Lembre-se de que é fundamental checar esse prazo com o seu médico, pois dependendo do seu caso específico, pode ser necessário prolongá-lo.Veja mais em: O que fazer se um ponto de cirurgia abrir Não existe um prazo ideal estimado para que a mulher se recupere o suficiente para ter relações sexuais novamente. Cada mulher possui o seu próprio organismo e, além disso, outros fatores também influenciam nesse processo, como hormônios, cicatrização e inseguranças com o corpo.De acordo com a medicina, o tempo ideal para a recuperação do útero e da cicatrização da vagina ou do abdômen - em casos de partos normais e cesárea, respectivamente - é de 30 a 40 dias. No entanto, a relação sexual vai além desse tempo estabelecido - envolve também o quão confortável com a situação a mulher está. E, por isso, esse período pode acabar se prolongando.Sugestão: Como tomar banho depois de uma cirurgia A resposta é: depende. Segundo a medicina, não existem contraindicações para o sexo após a cirurgia de varizes, desde que feito com cautela e que não tenha incômodos ou dores no local da cirurgia. Contudo, a mulher pode se sentir um pouco desconfortável para retomar a rotina sexual pouco tempo após a operação. Ou seja: a decisão de ter relação após a cirurgia de varizes depende inteiramente de quão confortável a mulher está consigo mesma e com a situação.Leia também: Como desinchar após uma cirurgia Este artigo é meramente informativo, no umCOMO não temos capacidade de receitar nenhum tratamento médico nem realizar nenhum tipo de diagnóstico. Convidamos você a recorrer a um médico no caso de apresentar qualquer tipo de condição ou mal-estar. Se pretende ler mais artigos parecidos a Quanto tempo depois de uma cirurgia posso ter relação? - Vida sexual no pós-operatório, recomendamos que entre na nossa categoria de Doenças e Efeitos Secundários. Artigos relacionados Hugo 17/07/2021 Fiz uma cirurgia de tendão de aquiles. Com quanto tempo posso ter relação sexual? Tamiris 26/12/2018 Quanto tempo posso ter relação sexual?de cirurgia e lipo rosimeriogorraobernardes 10/08/2018 Oi, fiz cirurgia de retirada da vizícula a 14 dias, sera q posso varrer casa e lavar louças? Obgada. Fiz uma cirurgia de vesícula a 30 dias, quanto tempo posso ter relação sexual? Oi! Após cirurgias abdominais o mais importante é conversar com seu médico, ou especialista na área, antes de retomar atividades que incluem mobilizar objetos pesados ou exercícos mais importantes. Todos os conteúdos publicados no doctoralia.com.br, principalmente perguntas e respostas na área da medicina, têm caráter meramente informativo e não devem ser, em nenhuma circunstância, considerados como substitutos de aconselhamento médico. Depois de retirar a vesícula quanto tempo depois posso ter relações e tentar engravidar? Costumo recomendar repouso sexual de 15 dias após colecistectomia laparoscópica, mas você deve conversar com seu cirurgião a respeito disso pessoalmente. ok? Dra. Helena Koerbel Cirurgião do aparelho digestivo Relações sexuais estão liberadas entre 10 e 15 dias. Quanto à gravidez o ideal é aguardar 6 meses após a cirurgia para iniciar as tentativas. Geralmente o repouso sexual após a cirurgia costuma ser de 15 dias. Quanto a engravidar, cada caso deve ser orientado pelo cirurgião. Se a cirurgia for tranquila, sem complicações, não há tempo, nem contraindicação a gravidez...colecistectomias complicadas devem ser orientadas caso a caso pelo médico. Fiz cirurgia de retirada de vesícula faz 1 semana. Quando tempo após a cirurgia posso pegar minha bebe de 10 quilos? Fiz a cirurgia da vesícula e fui tirar os pontos só que notei que no meu umbigo ainda tem um ponto ele entra e sai pra fora é normal ou preciso ir no hospital pra remover ? Fiz colecistectomia há 2 dias, posso comer banana, seja da terra ou outro tipo de banana? Retirei a vesícula há 8 dias, vou tirar os pontos quarta feira, depois que tirar os pontos, posso fazer as atividades normalmente? Vou fazer um mês que fiz minha cirurgia de colecistectomia, no meu recituário médico está liberado exercício depois de 30 dias. Porém o exercício que pratico é o crossFit, e a maioria das atividades necessitam do abdômen. Posso retornar minhas atividades, sem maiores riscos? Fiz a retirada de um fibroadenoma na mama faz 7 dias, com quantos dias pode andar de moto ? E quanto tempo pode voltar a comer comidas remosas, ex camarão Com quantos dias após fazer miomectomia aberta pode comer camarão ou caranguejo ? Bom dia Fiz a colecistectomia por vídeo a 40 dias, não tive nenhuma complicação, posso voltar a fazer aula de jump? Qual o tempo de cicatrização dos pontos internos de uma colecistectomia aberta? Com quanto tempo posso comer camarão depois de retirar a vesícula? Todos os conteúdos publicados no doctoralia.com.br, principalmente perguntas e respostas na área da medicina, têm caráter meramente informativo e não devem ser, em nenhuma circunstância, considerados como substitutos de aconselhamento médico. A cirurgia de vesícula, também conhecida como colecistectomia, é um procedimento cirúrgico que visa a remoção da vesícula biliar, geralmente devido a problemas como cálculos biliares ou inflamação. Após a realização dessa cirurgia, muitos pacientes se questionam sobre a possibilidade de retomar a vida sexual e, especificamente, quantos dias após a cirurgia de vesícula pode ter relação.Tempo de recuperação pós-operatória pode variar de paciente para paciente, mas, em geral, o tempo médio para a recuperação inicial é de cerca de duas a quatro semanas. Durante esse período, é fundamental que o paciente siga as orientações médicas, evitando esforços físicos e atividades que possam comprometer a cicatrização.Relação sexual após a cirurgiaEm relação à atividade sexual, a maioria dos médicos recomenda que os pacientes aguardem pelo menos duas a quatro semanas após a cirurgia para retomar as relações sexuais. Essa recomendação se deve ao fato de que o corpo precisa de tempo para se recuperar e se adaptar à ausência da vesícula biliar.Fatores que influenciam o tempo de esperaO tempo necessário para retomar a atividade sexual pode variar dependendo de diversos fatores, como a técnica cirúrgica utilizada (laparoscópica ou aberta), a saúde geral do paciente e a presença de complicações durante ou após a cirurgia. Pacientes que se recuperam bem e não apresentam complicações podem voltar a ter relações sexuais mais rapidamente.Sinais de que é seguro retomar a atividade sexualAntes de retomar a vida sexual, é importante que o paciente esteja atento a alguns sinais que indicam que a recuperação está ocorrendo de forma adequada. Esses sinais incluem a ausência de dor intensa, a cicatrização adequada das incisões e a melhora geral do bem-estar. Se houver dúvidas, é sempre aconselhável consultar o médico responsável.Cuidados durante a retomada da vida sexualAo retomar a atividade sexual, é essencial que o paciente tome alguns cuidados para evitar desconfortos ou complicações. Isso inclui escolher posições que não exerçam pressão sobre a região abdominal e evitar movimentos bruscos. A comunicação com o parceiro também é fundamental para garantir que ambos se sintam confortáveis durante esse período de adaptação.Possíveis complicaçõesEmbora a maioria dos pacientes possa retomar a vida sexual sem problemas, algumas complicações podem ocorrer. É importante estar atento a sintomas como dor intensa, sangramento ou febre, que podem indicar problemas na recuperação. Caso esses sintomas apareçam, o paciente deve procurar atendimento médico imediatamente.Importância do acompanhamento médicoO acompanhamento médico é crucial após a cirurgia de vesícula. O médico pode fornecer orientações personalizadas sobre a recuperação e a retomada das atividades, incluindo a vida sexual. Além disso, ele pode esclarecer dúvidas e ajudar a identificar qualquer sinal de complicação que possa surgir durante o processo de recuperação.Considerações finais sobre a vida sexual após a cirurgiaRetomar a vida sexual após a cirurgia de vesícula é uma preocupação comum entre os pacientes. Em geral, a maioria pode voltar a ter relações sexuais após duas a quatro semanas, mas é fundamental respeitar o tempo de recuperação do corpo e seguir as orientações médicas para garantir uma recuperação segura e saudável.