Continue

Sensibit D es un medicamento para combatir las alergias, por su contenido de Loratadina, que añade propiedades contra el dolor y la fiebre por el Paracetamol y, en el caso de las presentaciones con Fenilefrina, también para descongestionar las vías respiratorias. Nombres Comerciales: Sensibit D Nombre Genérico: Loratadina y Paracetamol Presentaciones y Vía de Administración: Tabletas, jarabe y solución para administración oral. Sus usos más frecuentes son para: Alergias / Resfriado / Gripa. En general, por sus propiedades es un medicamento de utilidad para los siguientes padecimientos: Fiebre de heno o rinitis alérgica, que es una respuesta inmunológica que se manifiesta por exceso de moco en la nariz y estornudos. Resfriado común. Gripa o Influenza tipo A, conocida también como gripa aviar. Este medicamento es de venta libre en México, pero es importante asegurarse de que se usa para padecimientos virales como la gripa o el catarro, además de alergias. No debe usarse en caso de infecciones por bacterias u hongos. Siga las instrucciones de la etiqueta del producto. Sensibit D Precio Para encontrar el mejor precio compara varias farmacias en nuestra siguiente sección. Precio Farmacias del Ahorro Farmacias San Pablo Farmatodo Superama Tabletas $43 $43 $56 $60 Jarabe $76 $77 $84.50 $81 Solución $107 $118.50 $85.50 $89 **Es importante aclarar que estos precios fueron tomados de la farmacia en línea en una investigación hecha por el equipo de quefarmacia en Enero 2020, los precios pueden modificarse con el tiempo y la sucursal de la farmacia.** Para adquirir las tabletas por un precio más económico puedes dirigirte a Farmacias del Ahorro o San Pablo, que son quienes ofrecen los precios más baratos para esta presentación. Por otro lado, si tu opción es el jarabe puedes conseguirla en Farmacias del Ahorro un 10% más barata que en la farmacia más cara. Si deseas la solución, es mejor que la compres en Farmatodo, pues, es donde está más económica. Presentaciones y forma de administración Tabletas de 2.5 mg de Loratadina, 5 mg de clorhidrato de Fenilefrina y 500 mg de Paracetamol. Viene en cajas con 12 piezas. Son fabricadas por Laboratorios Liomont en la marca comercial Sensibit D NF. Jarabe de 60 ml en concentración de 0.1666 mg de Loratadina/ml y 32 mg de Paracetamol/ml. Fabricado por Laboratorios Liomont en la marca comercial Sensibit D Preescolar. Solución Escolar en presentación de 120 ml en concentración de 0.1666 mg de Loratadina/ml, 32 mg de Paracetamol/ml y 0.3333 mg de clorhidrato de Fenilefrina/ml. Fabricado por Laboratorios Liomont en la marca comercial Sensibit D NF Escolar. Dosis y usos recomendados por edad Presentación 2 a 12 años Adultos Veces al día Tabletas No 2 tabletas 2 Jarabe 5 a 10 ml (Niños 2 a 8 años) No 3 Solución Escolar 10 a 15 ml (Niños de 6 a 12 años) No. 3 *Consulta a tu médico para recibir el uso y dosis correcta. No se deben exceder las dosis indicadas en la tabla. Los efectos del medicamento se perciben alrededor de 30 minutos después de tomar la dosis. Generales. No usar en personas con glaucoma de ángulo estrecho, diabetes mellitus no controlada, enfermedad renal, enfermedad del hígado, hipertiroidismo y otros padecimientos. Alergias o hipersensibilidad. No se debe tomar si se sabe que presenta reacciones alérgicas a la Loratadina u otros componentes de acuerdo con la presentación. Mezcla con alcohol. El alcohol no tiene efectos sobre la función de Sensibit D, sin embargo, añade malestares adicionales al padecimiento por el que se está medicando. Mezclar con otros medicamentos. No combinar con anticoagulantes como la Cumarina, Cimetidina, Eritromicina y Ketoconazol. Las presentaciones con Fenilefrina no deben combinarse con Pseudoefedrina. Combinación de Sensibit D en embarazo y lactancia EMBARAZO ALTO LACTANCIA BAJO RIESGO BAJO Sensibit D, por su contenido de Loratadina y Paracetamol es considerado por la FDA (Food & Drug Administration) como un medicamento de riesgo tipo B. El mayor riesgo está en las presentaciones con Fenilefrina que es tipo C. Según estudios médicos de e-lactancia.org, Sensibit D es segura durante la lactancia al mostrar una filtración pequeña con respecto a la Loratadina y el Paracetamol. Con respecto a la Fenilefrina también pudiera ser de bajo riesgo. Se debe contemplar el riesgo de que la lactancia se suspenda por el uso del medicamento. Efectos secundarios Sensibit D es un medicamento seguro a las dosis permitidas. A pesar de ello puede producir efectos secundarios en más de 1 de cada 100 personas que lo toman. Estos síntomas son: Pueden presentarse también otros efectos, con una frecuencia que afecta a menos de 1 de cada 100 pacientes: Trastornos en la piel – Caída de cabello. Reacciones alérgicas – Anafilaxia. Sistema nervioso central – Mareos, nerviosismo, agitación, insomnio, etc. Aparato circulatorio – Palpitaciones y taquicardia. Alteraciones en el funcionamiento del hígado. Dilatación anormal de la pupila. Mantenga informado a su médico en caso de que se presente algún síntoma secundario. Recuerde que las respuestas alérgicas pueden ser muy peligrosas, además de que en algunas presentaciones se incluye el colorante Rojo 6, que puede afectar a personas sensibles al mismo. Sensibit XP es un medicamento que se encuentra elaborado con Ambroxol y Loratadina, los cuales le proporcionan a éste fármaco la capacidad de actuar sobre los pulmones y ayudar a que el moco pueda ser expulsado, además cuenta con una acción antialérgica y antiinflamatoria, siendo muy eficaz en varios procesos patológicos. Nombres Comerciales: Sensibit XP Nombre Genérico: Ambroxol / Loratadina Presentaciones y Vía de Administración: Sus usos más frecuentes son para: Tos / Rinitis / Sinusitis / Bronquitis Por lo tanto, Sensibit XP es perfecto para: Tos con flema Resfriado Rinitis: Trastorno en el que se presenta comezón, obstrucción de las vías aéreas y estornudos. Sinusitis: Inflamación de los senos nasales y paranasales. Bronquitis: Inflamación de la mucosa que compone a los bronquios. Rinofaringitis: Infección que afecta a la laringe y a la nariz. Bronquiectasia: Dificultad para poder expulsar el moco que se encuentra en los pulmones debido a una afección que daña a éste órgano. Neumonía: Infección que provoca la inflamación de los alvéolos los cuales también se llenan de abundante mucosidad. Bronconeumonía: Inflamación que afecta inicialmente a los bronquios y que posteriormente se extiende hasta los alvéolos debido a una infección. Atelectasia por tapón mucoso: Colapso de un pulmón a causa de una obstrucción, en éste caso de moco. El mecanismo de acción de éste medicamento se divide en dos partes, primero, el Ambroxol actúa a nivel de los pulmones, aumentando la síntesis de surfactante pulmonar, una sustancia que evita que los alvéolos colapsen, promueve además un efecto desinflamatorio. Por otro lado tenemos a la Loratadina, la cual evita que la histamina, (molécula que desencadena los síntomas de alergia) pueda unirse a sus receptores para ejercer su efecto. Sensibit XP también se presenta como: Sensibit: la cual contiene únicamente loratadina. D: Contiene loratadina y paracetamol. D Infantil: Con fenilefrina, loratadina y paracetamol. RIN: Compuesto por fenilefrina y loratadina D NF: Con la misma composición que el anterior. Precio Farmatodo Farmacias San Pablo Farmacias del Ahorro Farmacias Chedraui Solución $217 $224 $226 $229 Tabletas $223 $231 $233 $235 **Es importante aclarar que estos precios fueron tomados de la farmacia en línea en una investigación hecha por el equipo de quefarmacia en marzo 2020, los precios pueden modificarse con el tiempo y la sucursal de la farmacia.** Presentaciones y formas de Administración Sensibit XP es un medicamento que se encuentra elaborado por los laboratorios Liomont bajo las siguientes presentaciones: Tabletas con 5 mg de loratadina y 30 mg de ambroxol. Se encuentra disponible en cajas con 10, 20 y 30 tabletas. Solución con 100 mg de loratadina y 600 mg de ambroxol. Se encuentra en frascos con 60 ml de contenido y un vasito o pipeta para medir las dosis. Dosis Recomendadas por Edad Presentación 1 a 12 años Adultos Veces al día Solución 1.25 – 5 ml No 2 Tabletas 1/2 1 2 *Uso y dosis debe ser siempre recetada por un médico* Medicamento en niños: Las tabletas no se administran en niños menores a los 6 años. La dosis exacta de la solución va a variar dependiendo de la edad del niño. Para aquellos que posean tan sólo un año de edad la dosis corresponderá a 1.25 ml. En niños de 6 años será de 2.5 ml y en niños con pesos superiores a los 30 kg de peso la dosis es de 5 ml. El medicamento debe medirse en el vasito o pipeta dosificadora, se debe administrar directamente en la boca, posteriormente se debe tomar un poco de agua. Las tabletas deberán administrarse con abundante agua, puede ser antes o después de las comidas, deben tragarse enteras. Generales: No se debe administrar Sensibit XP en personas con úlceras pépticas. Alergias: No se debe administrar éste medicamento en personas que posean hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula. Mezcla con Alcohol: A pesar de que el efecto del alcohol no se ve aumentado por el medicamento no se recomienda mezclarlo durante el tratamiento. Mezcla con otros medicamentos: La administración concomitante de Sensibit XP con ketoconazol, cimetidina o eritromicina aumentan los niveles plasmáticos de éstos. Compatibilidad de Sensibit XP en Embarazo y Lactancia EMBARAZO ALTO LACTANCIA BAJO RIESGO BAJO Sensibit XP no es compatible con el embarazo. Esto se debe a que los estudios de la FDA demuestran que posee un riesgo tipo C y que puede afectar al feto durante la gestación. Sensibit XP es seguro durante la lactancia. Investigaciones realizadas por e-lactancia.org demuestran que tanto la loratadina como el ambroxol son compuestos que no se excretan de forma significativa a la leche materna, por lo que se considera seguro para el bebé. Efectos Secundarios Sensibit XP podría causar los siguientes efectos secundarios: Aparato digestivo: gastritis, náuseas, diarrea o estreñimiento, boca seca, incapacidad para mantener la saliva en la cavidad oral. Sistema respiratorio: congestión nasal. Sistema nervioso: dolor de cabeza, somnolencia, fatiga. Aparato renal: dolor al orinar. Piel y anexos: erupción. En caso de presentar alguno de estos síntomas acuda de forma inmediata a su médico tratante. Nombres comerciales: Sensibit, Sensibit D/ XP/ Rin. Nombre genérico: Loratadina. Sirve para: alergias, rinitis, resfriado común. Sensibit es un antialérgico indicado para la prevención o tratamiento de los síntomas asociados a procesos alérgicos por polen, animales domésticos, polvo u otros agentes. También es utilizado como tratamiento sintomático de: Rinitis alérgica. Conjuntivitis alérgica. Trastornos dermatológicos que causan prurito. Urticaria. Manifestaciones alérgicas por inhalación o por alimentos. Reacciones alérgicas por sensibilidad a la penicilina, picaduras de insectos como las avispas, entre otros. Este medicamento se presenta en diferentes líneas como: Sensibit D. Sensibit XP. Sensibit Rin. En primer lugar, se encuentra Sensibit D, el cual está formulado con Loratadina y Paracetamol, bajo la presentación de jarabe pediátrico. Está indicado para aliviar los síntomas de la gripe y como auxiliar para el alivio de la rinitis alérgica y fiebre del heno. Luego está a disposición Sensibit XP, que está formulado con Loratadina y Ambroxol, bajo la presentación de solución. Está indicado para el alivio sintomático de la tos con flemas y resfriados. Rinitis alérgica, sinusitis, rinofaringitis, faringoamigdalitis y bronquitis. Y finalmente, Sensibit Rin, el cual está formulado con Loratadina y Clorhidrato de Fenilefrina, bajo la presentación de solución pediátrica, cápsulas de liberación prolongada y solución oral. Está indicado para aliviar síntomas del resfriado como: nariz tapada, estornudos, lagrimeo, comezón de la nariz y garganta. Precios de Sensibit Esta medicina tiene un precio bastante accesible y varía entre las farmacias, a continuación se reflejan algunas presentaciones disponibles en diferentes farmacias con sus respectivos precios. Precio de Sensibit Farmacia San Pablo Farmalisto Superama Farmacias del Ahorro Tabletas $159.50 $157.00 $265.00 $151.00 Solución Pediátrica $100.50 $102.50 $100.00 $107.00 **Es importante aclarar que estos precios fueron tomados de la farmacia en línea en una investigación hecha por el equipo de quefarmacia en Febrero 2020, los precios pueden modificarse con el tiempo y la sucursal de la farmacia.** Este medicamento tanto en su presentación en Tabletas como en Solución Pediátrica se consigue más barato en Superama, en el caso de las Tabletas, la caja es de 20 pastillas, mientras que en el resto de las farmacias indicadas anteriormente las cajas son de 10 pastillas, representando un ahorro significativo adquirir esta medicina en Superama, ya que el costo por tableta será de $13.25, y el ahorro de dinero será de hasta un 12%. Entonces, si quieres ahorrar algo de dinero, visita una de las sucursales de Superama, o compra en línea y te harán la entrega a domicilio. Presentaciones y Formas de Administración Sensibit es elaborado por laboratorios Liomont y se encuentra en diferentes presentaciones: Tabletas: Loratadina 10 mg. Solución: Loratadina 100 mg. Loratadina 5 mg / Ambroxol 30 mg. Jarabe: Loratadina 100 mg. Paracetamol y Loratadina. También Fenilefrina, Paracetamol y Loratadina. Cápsulas: Fenilefrina 30 mg / Loratadina 5 mg Dosis Recomendadas por Edad Presentación 2 años 2 a 12 años Mayor 12 años Veces al día Solución pediátrica 1 cucharadita 1 cucharadita 30 kg 1 Tabletas No recomendada 1 >6 años y >30 kg 1 1 Jarabe No recomendada 1 cucharadita 30 kg 1 ** USO Y DOSIS DEBE SER SIEMPRE RECOMENDADA POR UN MÉDICO** Sensibit no es recomendado en niños menores a 2 años, ya que su seguridad y eficacia no han sido establecidas. IMPORTANTE: Esta medicina se puede tomar con o sin comida. No debe exceder la dosis recomendada y no dejar al alcance de los niños, contiene aspartamo Generales: No debe administrarse en niños menores de 2 años. En caso de ser paciente con insuficiencia hepática debe consultar al médico antes de tomar Sensibit. Alergias: Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a la Loratadina o demás componente de la fórmula de acuerdo a la línea de presentaciones del fármaco. Mezcla con alcohol: En estudios realizados para evaluar las pruebas de desempeño psicomotor, loratadina no tiene efectos de potenciación cuando se administra con alcohol. Sin embargo, no es recomendable consumir alcohol mientras esté en tratamiento. Mezcla con otros medicamentos: Se ha reportado que la administración concomitante con ketoconazol, eritromicina o cimetidina ha incrementado la concentración plasmática de la loratadina sin que se hayan observado cambios clínicamente significativos. Se debe administrar con precaución con otros medicamentos de los que se conoce que inhiben el metabolismo hepático. Por lo tanto, para la administración en pacientes con insuficiencia hepática o renal deberá consultar con su médico. EMBARAZO BAJO LACTANCIA BAJO RIESGO BAJO Existen pocos datos clínicos sobre tomar Sensibit durante el embarazo, por lo tanto no debe administrarse, ya que como afirma FACMED no hay estudios adecuados y bien controlados en humanos. Según e-lactancia la Loratadina se excreta en leche materna en cantidades no significativas y afirma Merlob (2002) que no se observaron problemas en lactantes de madres que lo tomaban. Por lo tanto, tomar Loratadina en embarazo tiene muy bajo riesgo. Efectos Secundarios Los efectos secundarios reportados son mínimos, siendo los más frecuentes: dolor de cabeza, fatiga, somnolencia y boca seca. En niños nerviosismo y aumento de peso. Otros efectos que se han presentado con poca frecuencia son: Aparato digestivo: gastritis, náuseas y aumento del apetito. Hígado: alteraciones en el hígado. En caso de insuficiencia hepática debe consultar al médico antes de tomar Sensibit. Piel: erupción cutánea. Y finalmente, algunos efectos secundarios que se pueden presentar en muy raras ocasiones son: Por consiguiente, en caso de presentarse algún síntoma por efectos del medicamento debe consultar inmediatamente a su médico, quien le indicará que hacer al respecto. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada TABLETA contiene:Loratadina 2.5 mgClorhidrato de fenilefrina 5 mgParacetamol 500 mgExcipiente cbp 1 tableta INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Antihistamínico, descongestivo, antipirético y analgésico.Para el alivio de la gripe de origen viral (influenza tipo A). Auxiliar para el alivio de algunas de las rinitis alérgicas y fiebre del heno. FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA: SENSIBIT D® NF combina la acción de la Loratadina, Clorhidrato de Fenilefrina y Paracetamol.Loratadina: Es un antihistamínico tricíclico potente de acción prolongada con actividad como antagonista selectivo de los receptores H1 periféricos que no tiene efecto sedante. Se absorbe por completo después de la administración por vía oral con vida media de eliminación de 9 horas; sin embargo, su efecto antihistamínico persiste durante 24 horas. Su inicio de acción es de aproximadamente 30 minutos. Se metaboliza en forma extensa en el hígado y se excreta a través de la orina y las heces.Clorhidrato de Fenilefrina: Administrado por vía oral ,se absorbe a través del tracto gastrointestinal; como efecto de primer paso es metabolizado por la monoaminooxidasa, tanto a nivel intestinal como a nivel hepático. Su administración trae consigo descongestión de la mucosa nasal.Paracetamol: Es rápidamente absorbido a través del tracto gastrointestinal, el pico de la concentración plasmática se registra dentro de un lapso comprendido entre los 30 y 120 minutos de haber sido administrado. Se metaboliza en el hígado y se excreta por orina, fundamentalmente en forma conjugada como glucurónidos y sulfato; menos del 5% se excreta en forma inalterada. La vida media de eliminación es de 1-4 horas. A dosis terapéuticas la unión a proteínas es escasa. Ejerce acción antitérmica al actuar sobre el centro termorregulador, produciendo pérdida de calor por vasodilatación periférica y sudación. CONTRAINDICACIONES: Está contraindicado en pacientes hipersensibles a cualquiera de los componentes de la fórmula, así como en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho, retención urinaria, hipertensión grave, enfermedad arterial coronaria severa, hipertiroidismo, diabetes mellitus descompensada, enfermedad hepática o renal y con anticoagulantes.No se use en menores de 12 años. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: El potencial de tales efectos de los fármacos contenidos en la formulación no ha sido establecido. Aun cuando no se ha evidenciado daño fetal, no se recomienda su uso durante el embarazo. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Loratadina: Los efectos adversos comúnmente reportados asociados al uso de loratadina han incluido fatiga, cefalea, somnolencia, boca seca, trastornos gastrointestinales como náusea y gastritis, y síntomas alérgicos como erupciones cutáneas. En raras ocasiones, durante la comercialización de loratadina, se han informado casos de alopecia, anafilaxia, alteraciones hepáticas, taquicardia y palpitaciones. Clorhidrato de Fenilefrina: Pacientes particularmente sensibles a los agentes simpaticomiméticos pueden experimentar estimulación leve. También se ha reportado náusea, somnolencia, cefalea, debilidad, mareo, taquicardia, palpitaciones, insomnio, nerviosismo, excitabilidad, agitación y midriasis. De considerarse la posibilidad de que se presenten otros eventos adversos asociados a los agentes simpaticomiméticos.Paracetamol: Los eventos adversos asociados a la administración de paracetamol incluyen reacciones hematológicas y erupciones cutáneas. Después de administraciones prolongadas se han reportado efectos nefrotóxicos. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: El potencial de tales efectos de los principios activos contenidos en las formulaciones del producto no ha sido establecido. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Loratadina: Se ha reportado un incremento en las concentraciones plasmáticas de loratadina después de la administración concomitante de ketoconazol, eritromicina o cimetidina en estudios clínicos controlados, pero no se han observado cambios clínicamente significativos (incluyendo electrocardiográficos). Cuando se administra con otros medicamentos que se conoce inhiben el metabolismo hepático, se debe administrar con precaución hasta que se completen los estudios de interacción definitivos. En pruebas de desempeño psicomotor, loratadina no tiene efectos de potenciación cuando se administra con alcohol. Paracetamol: Puede potenciar el efecto de los anticoagulantes como la cumarina o los derivados de la indandiona cuando se usa a dosis superiores a los 2 g por día por periodos prolongados posiblemente por disminución de la síntesis de los factores procoagulantes. Los fármacos inductores de enzimas, como los barbitúricos y el alcohol, pueden acelerar el metabolismo del paracetamol y aumentar el riesgo de necrosis hepática resultante de la administración de dosis excesivas de paracetamol.Clorhidrato de Fenilefrina: La administración simultánea de fenilefrina con fenilpropanolamina puede ocasionar accidente vascular cerebral. ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO: Loratadina: Cualquier antihistamínico debe suspenderse por lo menos 72 horas antes de practicar pruebas cutáneas con extractos de alérgenos para evitar resultados falsos-negativos.Paracetamol: Puede interferir con la determinación sérica de ácido úrico cuando se utiliza el método del ácido úrico fosfotúngstico. También las determinaciones de glucosa sérica pueden reportar valores falsamente disminuidos cuando se usa el método de la glucosa oxidasa/peroxidasa.Clorhidrato de Fenilefrina: No se han reportado a la fecha. PRECAUCIONES GENERALES: Se debe advertir a los pacientes de no tomar paracetamol, antihistamínicos o simpaticomiméticos adicionales cuando se encuentren bajo tratamiento con este medicamento. No debe tomarse con bebidas alcohólicas.Loratadina: A los pacientes con deterioro severo en la función hepática debe administrárseles una dosis menor, debido a que pueden presentar un aclaramiento reducido de la loratadina.Clorhidrato de Fenilefrina: En pacientes de 60 años o mayores, también es más probable que los simpaticomiméticos causen reacciones adversas como confusión, alucinaciones, crisis convulsivas, depresión del SNC y muerte. Por lo tanto, debe procederse con precaución cuando se administre este tipo de formulaciones en pacientes ancianos.Paracetamol (acetaminofén): Puede causar daño hepático, por lo que no debe administrarse por más de 5 días. No se use este producto con otros que contengan paracetamol. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.Dosis: Adultos y niños mayores de 12 años: 2 tabletas cada 12 horas. No exceder la dosis recomendada. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: En el caso de sobredosis, debe iniciarse inmediatamente el tratamiento sintomático y coadyuvante, manteniéndolo durante todo el tiempo necesario.Manifestaciones: Loratadina: Se ha reportado somnolencia, taquicardia y cefalea con dosis excesivas (40 a 180 mg).Clorhidrato de Fenilefrina: A dosis elevadas, los medicamentos simpaticomiméticos pueden producir mareos, cefalalgia, náuseas, vómito, sudación, sed, taquicardia, dolor precordial, palpitaciones, hipertensión, dificultad para la micción, debilidad muscular, tensión, ansiedad, inquietud e insomnio. Algunos pacientes pueden presentar psicosis tóxicas con ilusiones y alucinaciones. Algunos pueden desarrollar arritmias cardiacas, colapso circulatorio, convulsiones, coma e insuficiencia respiratoria.Paracetamol: Los síntomas incluyen palidez, náusea, dolor abdominal, vómito, hemorragia gastrointestinal, daño hepático, edema cerebral, necrosis tubular renal. Una complicación grave de la sobredosis de paracetamol es la necrosis hepática aguda. En adultos y adolescentes, rara vez se ha reportado toxicidad hepática después de la ingestión de sobredosis aguda de menos de 10 g. La muerte es poco frecuente y ha sido reportada rara vez con sobredosis de menos de 15 g. Los síntomas de toxicidad hepática pueden no ser aparentes inmediatamente. Los pacientes que han ingerido sobredosis de paracetamol pueden parecer saludables durante los primeros tres días después de la ingestión de la sobredosis y después morir debido al daño hepático. Se ha reportado hiperglucemia e hipoglucemia después de sobredosis de paracetamol.Tratamiento: Se deben considerar medidas convencionales para eliminar el fármaco no absorbido en el estómago, como la administración de carbón activado en forma de suspensión espesa en agua. Debe considerarse el efectuar lavado gástrico. La solución salina fisiológica es el vehículo de elección para el lavado gástrico, especialmente en niños. En adultos puede usarse agua corriente; sin embargo, antes de la siguiente instilación debe extraerse el mayor volumen posible de líquido administrado previamente. Los catárticos salinos atraen agua dentro del intestino por ósmosis y, por lo tanto, pueden ser útiles por su rápida acción diluyente del contenido intestinal. La loratadina no se depura por hemodiálisis en grado alguno apreciable. No se sabe si la loratadina puede ser eliminada por diálisis peritoneal. Después de administrar tratamiento de urgencia, se debe mantener al paciente bajo vigilancia médica.El tratamiento de los signos y síntomas de sobredosis es sintomático y coadyuvante. No se deben utilizar medicamentos estimulantes (analépticos). Pueden administrarse vasoconstrictores para el tratamiento de la hipotensión. Los barbitúricos de acción corta, diazepam o paraldehído pueden administrarse para controlar las crisis convulsivas.La hiperpirexia, especialmente en los niños, puede necesitar tratamiento con baños de esponja con agua tibia o con una manta hipotérmica. La apnea se trata con ayuda ventilatoria.En caso de sobredosis de paracetamol, el lavado gástrico debe seguirse de administración intravenosa de N-acetilcisteína o metionina por vía oral. Puede considerarse tratamiento adicional (más metionina, cisteamina intravenosa o N-acetilcisteína) sobre la base de los niveles plasmáticos de paracetamol y el tiempo transcurrido desde la ingestión de la sobredosis. PRESENTACIONES: Caja con envase con 2, 4, 8, 12 y 24 tabletas. RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO: Consérvese a no más de 30 °C y en lugar seco. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Literatura exclusiva para médicos. No se deje al alcance de los niños. No se use en el embarazo y lactancia. No se use en menores de 12 años. Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx Hecho en México por: LABORATORIOS LIOMONT, S.A. de C.V. Ética Farmacéutica desde 1938 Adolfo López Mateos No. 68, Col. Cuajimalpa C.P. 05000, Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México, México Reg. Núm. 007M2006 SSA VI ® Marca registrada Nombres comerciales: Sensibit, Sensibit D/ XP/ Rin. Nombre genérico: Loratadina. Sirve para: alergias, rinitis, resfriado común. Sensibit es un antialérgico indicado para la prevención o tratamiento de los síntomas asociados a procesos alérgicos por polen, animales domésticos, polvo u otros agentes. También es utilizado como tratamiento sintomático de: Rinitis alérgica. Conjuntivitis alérgica. Trastornos dermatológicos que causan prurito. Urticaria. Manifestaciones alérgicas por inhalación o por alimentos. Reacciones alérgicas por sensibilidad a la penicilina, picaduras de insectos como las avispas, entre otros. Este medicamento se presenta en diferentes líneas como: Sensibit D. Sensibit XP. Sensibit Rin. En primer lugar, se encuentra Sensibit D, el cual está formulado con Loratadina y Paracetamol, bajo la presentación de jarabe pediátrico. Está indicado para aliviar los síntomas de la gripe y como auxiliar para el alivio de la rinitis alérgica y fiebre del heno. Luego está a disposición Sensibit XP, que está formulado con Loratadina y Ambroxol, bajo la presentación de solución. Está indicado para el alivio sintomático de la tos con flemas y resfriados. Rinitis alérgica, sinusitis, rinofaringitis, faringoamigdalitis y bronquitis. Y finalmente, Sensibit Rin, el cual está formulado con Loratadina y Clorhidrato de Fenilefrina, bajo la presentación de solución pediátrica, cápsulas de liberación prolongada y solución oral. Está indicado para aliviar síntomas del resfriado como: nariz tapada, estornudos, lagrimeo, comezón de la nariz y garganta. Precios de Sensibit Esta medicina tiene un precio bastante accesible y varía entre las farmacias, a continuación se reflejan algunas presentaciones disponibles en diferentes farmacias con sus respectivos precios. Precio de Sensibit Farmacia San Pablo Farmalisto Superama Farmacias del Ahorro Tabletas $159.50 $157.00 $265.00 $151.00 Solución Pediátrica $100.50 $102.50 $100.00 $107.00 **Es importante aclarar que estos precios fueron tomados de la farmacia en línea en una investigación hecha por el equipo de quefarmacia en Febrero 2020, los precios pueden modificarse con el tiempo y la sucursal de la farmacia.** Este medicamento tanto en su presentación en Tabletas como en Solución Pediátrica se consigue más barato en Superama, en el caso de las Tabletas, la caja es de 20 pastillas, mientras que en el resto de las farmacias indicadas anteriormente las cajas son de 10 pastillas, representando un ahorro significativo adquirir esta medicina en Superama, ya que el costo por tableta será de $13.25, y el ahorro de dinero será de hasta un 12%. Entonces, si quieres ahorrar algo de dinero, visita una de las sucursales de Superama, o compra en línea y te harán la entrega a domicilio. Presentaciones y Formas de Administración Sensibit es elaborado por laboratorios Liomont y se encuentra en diferentes presentaciones: Tabletas: Loratadina 10 mg. Solución: Loratadina 100 mg. Loratadina 5 mg / Ambroxol 30 mg. Jarabe: Loratadina 100 mg. Paracetamol y Loratadina. También Fenilefrina, Paracetamol y Loratadina. Cápsulas: Fenilefrina 30 mg / Loratadina 5 mg Dosis Recomendadas por Edad Presentación 2 años 2 a 12 años Mayor 12 años Veces al día Solución pediátrica 1 cucharadita 1 cucharadita 30 kg 1 Tabletas No recomendada 1 >6 años y >30 kg 1 1 Jarabe No recomendada 1 cucharadita 30 kg 1 ** USO Y DOSIS DEBE SER SIEMPRE RECOMENDADA POR UN MÉDICO** Sensibit no es recomendado en niños menores a 2 años, ya que su seguridad y eficacia no han sido establecidas. IMPORTANTE: Esta medicina se puede tomar con o sin comida. No debe exceder la dosis recomendada y no dejar al alcance de los niños, contiene aspartamo Generales: No debe administrarse en niños menores de 2 años. En caso de ser paciente con insuficiencia hepática debe consultar al médico antes de tomar Sensibit. Alergias: Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a la Loratadina o demás componente de la fórmula de acuerdo a la línea de presentaciones del fármaco. Mezcla con alcohol: En estudios realizados para evaluar las pruebas de desempeño psicomotor, loratadina no tiene efectos de potenciación cuando se administra con alcohol. Sin embargo, no es recomendable consumir alcohol mientras esté en tratamiento. Mezcla con otros medicamentos: Se ha reportado que la administración concomitante con ketoconazol, eritromicina o cimetidina ha incrementado la concentración plasmática de la loratadina sin que se hayan observado cambios clínicamente significativos. Se debe administrar con precaución con otros medicamentos de los que se conoce que inhiben el metabolismo hepático. Por lo tanto, para la administración en pacientes con insuficiencia hepática o renal deberá consultar con su médico. EMBARAZO BAJO LACTANCIA BAJO RIESGO BAJO Existen pocos datos clínicos sobre tomar Sensibit durante el embarazo, por lo tanto no debe administrarse, ya que como afirma FACMED no hay estudios adecuados y bien controlados en humanos. Según e-lactancia la Loratadina se excreta en leche materna en cantidades no significativas y afirma Merlob (2002) que no se observaron problemas en lactantes de madres que lo tomaban. Por lo tanto, tomar Loratadina en embarazo tiene muy bajo riesgo. Efectos Secundarios Los efectos secundarios reportados son mínimos, siendo los más frecuentes: dolor de cabeza, fatiga, somnolencia y boca seca. En niños nerviosismo y aumento de peso. Otros efectos que se han presentado con poca frecuencia son: Aparato digestivo: gastritis, náuseas y aumento del apetito. Hígado: alteraciones en el hígado. En caso de insuficiencia hepática debe consultar al médico antes de tomar Sensibit. Piel: erupción cutánea. Y finalmente, algunos efectos secundarios que se pueden presentar en muy raras ocasiones son: Por consiguiente, en caso de presentarse algún síntoma por efectos del medicamento debe consultar inmediatamente a su médico, quien le indicará que hacer al respecto. Portada » ¿Para qué sirve el sensibit xp? Sensibit xp es un medicamento indicado para las afecciones respiratorias y alérgicas. Es un supresor de la tos y las alergias, así como afecciones que cursan con mucosidad y expectoración como bronquitis y neumonía. Facilita la expulsión de la flema y garantiza el alivio de los síntomas de la rinitis complicada con sinusitis. Es un medicamento mucolítico y supresor de la tos que contiene loratadina y ambroxol. Es un expectorante asociado con un supresor de la tos. ¿Para qué sirve? Este medicamento actúa de dos formas: Loratadina: Es un antihistamínico tricíclico potente de acción prolongada sin efecto sedante. Alivia la inflamación, la tos y otras respuestas alérgicas. Ambroxol: Es un expectorante y mucolítico que favorece la fluidificación del moco bronquial incrementando la cantidad de agua en el moco. Presentación Se presenta en: Caja con frasco con 120 mL y pipeta dosificadora. Caja con 20 tabletas. Composición Cada 100 mL de solución contiene: Loratadina: 100 mg. Clorhidrato de ambroxol: 600 mg. Vehículo c.b.p.: 100 mL. Cada tableta contiene: Loratadina: 5.000 mg. Clorhidrato de ambroxol: 30.000 mg. Excipiente cbp: Una tableta. Indicaciones Sensibit xp está especialmente indicado para el alivio sintomático de la tos con flema y el resfriado. Disuelve y facilita la expulsión de flemas en procesos respiratorios alérgicos asociados con tos y expectoración, tales como: Rinitis alérgica con sinusitis, rinofaringitis, faringoamigdalitis y bronquitis. Está indicado para el tratamiento de procesos broncopulmonares causados por alergia y que involucran un incremento en la viscosidad del moco. Se utiliza como parte de la terapia de pacientes con otras condiciones como bronquiectasia, neumonía, bronconeumonía, traqueostomia y atelectasia por tapón mucoso. Recetado como profilaxis pre y posquirúrgica, sobre todo en ancianos. Advertencias Debe utilizarse con precaucion en pacientes que padecen de insuficiencia hepática. Es recomendable administrar una dosis menor, ya que pueden tener una depuración lenta de loratadina. Se recomienda iniciar con la mitad de la dosis recomendada. Efectos secundarios En las dosis recomendadas sensibit no causa efectos secundarios de importancia. Entre los efectos adversos más frecuentes se tiene: Náusea, gastritis, xerostomía, constipación y diarrea, sialorrea y rinorrea, fatiga y cefalea, disuria, somnolencia, boca seca y erupción cutánea. En raras ocasiones se ha reportado alopecia, anafilaxia y alteraciones hepáticas. Contraindicaciones No debe utilizarse durante el embarazo, ya que no se ha establecido la seguridad del ambroxol y la loratadina. La loratadina se excreta en la leche materna, no debe administrarse durante la lactancia. Evitar en caso de hipersensibilidad o idiosincrasia a loratadina, ambroxol u otros componentes de la fórmula. No consumir en caso de padecer de úlcera péptica. No administrar a niños menores de 1 año. Puede causar somnolencia. Si esto ocurre, puede afectar la capacidad de conducir o manejar maquinaria por lo que se deben tomar las precauciones pertinentes. Interacciones La administración en simultáneo de ketoconazol, eritromicina o cimetidina ha demostrado tener un efecto de incremento en las concentraciones plasmáticas de loratadina en estudios clínicos controlados. Sin embargo, no se han presentado alteraciones significativas de la salud. Se debe de tener precaución cuando se administre conjuntamente con fármacos que inhiben el metabolismo hepático. La coadministración de simpaticomiméticos e IMAO con sensibit pueden provocar crisis hipertensivas. Los efectos antihipertensivos de la metildopa, mecamilamina, reserpina y alcaloides derivados del veratro pueden verse reducidos con el uso de sensibit. Pueden interactuar con los bloqueadores ß-adrenérgicos. Alteraciones en los resultados de laboratorio Cualquier antihistamínico debe suspenderse por lo menos 72 h antes de la práctica de pruebas cutáneas con extractos alérgenos. El ambroxol puede interferir con la determinación sérica del ácido úrico cuando se emplea el método del ácido úrico fosfotúngstico. Puede alterar las determinaciones de glucosa sérica. También las determinaciones de glucosa sérica pueden reportar valores falsamente disminuidos cuando se usa el método de la glucosa oxidasa/peroxidasa. Sobredosificación o ingesta accidental: manifestaciones y manejo Como sensibit es un medicamento combinando debemos de considerar la toxicidad potencial de la loratadina y el ambroxol. En caso de sobredosis se ha reportado taquicardia, cefalea y somnolencia. Si esto ocurre, se debe acudir al centro asistencial donde iniciarán un tratamiento sintomático y coadyuvante más medidas generales de sostén tales como inducir el vómito, aplicación de oxígeno, lavado gástrico y administración de líqu